

# 患者さんパスシート

カナ氏名  
氏名  
患者ID  
担当医

様

適用開始日  
適用予定日数 5日  
パス名 ヘマンジオル導入入院  
コメント

日付経過	入院前	入院	入院2日目	入院3日目	入院4日目	退院
目標	入院のスケジュールを理解しましょう		副作用を理解し、変わった事があったら早めにスタッフに知らせましょう			安心して退院できるようにしましょう
治療・処置	あらかじめ、形成外科の診察も済ませておきます。入院中にも一度診てもらいます。 		 ヘマンジオルを半分の量で開始します。 <b>1日2回！</b>		 ヘマンジオルシロップを退院後家庭で飲む量にします ※よければ一緒に見ながらおくすりの量を測ってみましょう <b>1日2回！</b>	
			※低血糖の予防のため、おくすりは哺乳直後に飲みます。おくすりをのんだあと、1-2時間後くらいが副作用の出やすい時間になります。(退院後も普段より哺乳が弱い時や、熱が出たり、嘔吐のかぜの際などは、おくすりは飲まずに、元気に飲めるようになったら再開するくらいでいましょう)			
検査	入院前にあらかじめ、スクリーニングの採血検査心電図や心臓超音波検査を済ませておきます		試験紙法による血糖検査をします		試験紙法による血糖検査をします	 採血があります
			必要に応じて試験紙法による血中糖検査をします			
説明指導	入院の説明があります					退院の説明があります
安静・入浴			 身体を拭くことができます。清拭用のお湯をお渡しします。医師の許可があれば沐浴室やシャワー室を利用することができます 			
食事			特に制限はありません。通常通りの食事・授乳でかまいません。普段使用している物をご利用ください			
その他	オムツは普段使用している物をご利用ください。ベッドからの転落を防ぐため、必ずベッド柵を上げてください。					

ご不明な点・お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく看護師におたずねください。

※この表はおおよその経過をお知らせするものです。状態により変更することもありますので、あらかじめご承知おきください。