















患者さんパスシート

カナ氏名
氏名
患者ID
担当医

様

適用開始日
適用予定日数
パス名
コメント

4日
皮下免疫療法導入入院

日付	/	/	/	/
経過	入院	入院2日目	入院3日目	退院
目標	入院の目的とスケジュールを理解しましょう	吸入を確実にいき、症状があったときには早めに看護師に伝えましょう		安心して退院できるようにしましょう
お薬	 アレルギー予防の薬剤の内服を継続します			
	 注射ごとに、症状の有無に関わらずメプチン・インタールの吸入を行います。注射部位のかゆみに応じて、アンテベート軟膏を塗布します。			
注射	10時11時14時15時の予定で注射があります 	10時11時14時15時の予定で注射があります 	10時11時14時の予定で注射があります 	10時13時の予定で注射があります 
説明・指導	入院の説明があります	状況により栄養士・薬剤師から説明があります 		退院の説明があります
安静	 注射の前後はモニターを装着します。それ以外の時間は普段通りに生活してください。			
トイレ	 制限はありません			
入浴	  身体を拭くことができます。医師の許可があればシャワーには入れます			
食事	特に制限はありません。アレルギーによる制限や食事形態の希望がある場合は栄養士、看護師にご相談ください			
その他	重篤なアレルギー症状の有無がないかを見ていきます。 注射の部位の痛みは、痛み止めを塗布したり、保冷剤で冷やしたりすることで緩和が可能です。 			退院後、当初は1週ごと位に外来で1回ずつ注射します。 

ご不明な点・お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく看護師におたずねください。

※この表はおおよその経過をお知らせするものです。状態により変更することもありますので、あらかじめご承知おきください。